


### 1) Inserimento gabbietta

Inserire la gabbietta per tempo su fogliocero. O inserirla in un favo di covata che si trova al centro dell'alveare, tagliando la porzione di favo sufficiente per accogliere la gabbietta e senza tagliare i fili dell'armatura (vedi schema). Quanto detto deve essere fatto almeno un giorno prima dell'ingabbiamento della regina, per dar modo alle api di asciugare il miele, così da avere una condizione di normalità al momento dell'inserimento dell'ape regina.

Mantenere il favo sempre al centro della colonia d'api. Questa gabbietta può rimanere all'interno dell'alveare permanentemente ed essere usata anche nel periodo della sciamatura: ingabbiando la regina poco prima che le api allevino celle reali e mantenendola in questo stato per una decina di giorni o anche più, si può ridurre la sciamatura.



### 2) Inserimento regina

Quando si inserisce la regina nella gabbietta si deve far attenzione con il fumo, non si deve irritare la regina né prima né dopo, specialmente quando è all'interno della gabbietta perché non ha via di scampo.

Per trovare la regina più velocemente si consiglia di marcare precedentemente in luglio o in agosto, così facendo si può anche capire se la regina è stata recentemente sostituita, il che è un segno evidente di un alveare in crisi (da quando è arrivata la varroa questo succede frequentemente).

### 3) Periodo di blocco covata

Effettuare l'ingabbiamento nel momento più opportuno, a seconda della zona, per un periodo di quattro settimane, dopo la terza settimana, a sfarfallamento completo, si effettua il trattamento chimico contro la varroa e alla quarta settimana si libera la regina. Per liberare l'ape regina è sufficiente aprire la porticina della gabbietta e quindi re-inserire il favo al suo posto.

Attenzione: non fare uscire l'ape regina con il fumo o altro, uscirà spontaneamente all'interno dell'alveare.

Richiudere la porticina dopo qualche giorno per evitare che le api costruiscano all'interno della gabbietta. Questo se l'operazione viene eseguita in primavera, altrimenti nel caso in cui questa venga svolta in autunno, la chiusura della porticina può avvenire nella primavera successiva.

### AVVERTENZE:

sincerarsi che tutto nell'alveare sia normale al momento dell'ingabbiamento; se in alcuni alveari la regina è stata recentemente sostituita (non si trova più quella marcata e se ne sceglie una giovane), assicurarsi che la nuova regina deponga prima di ingabbiarla. Può anche accadere che la regina sia prossima alla sostituzione, perché compromessa da un carico di varroa eccessivo, lo si capisce dalla presenza di celle lasciando intatte le celle reali, saranno poi le api a scegliere quale regina mantenere, infine, prima del trattamento chimico si asporta la poca covata eventualmente deposta dalla nuova regina. A riguardo è utile ricordare che da quando è arrivata la varroa gli alveari ad agosto / settembre sono già compromessi se nell'anno precedente non sono stati curati bene.



## CHIUSURA E APERTURA DELLA GABBIA

Per chiudere la gabbietta è sufficiente applicare una leggera pressione nei punti segnati.  
Per aprire, agire nei medesimi punti utilizzando la leva.

API-MO.BRU

